چیف ایڈیٹر: مجیب الرحمٰن شامی

روزنامہ پاکستان ملتان

THE DAILY PAKISTAN MULTAN

ایڈیٹر: عمر مجیب شامی

جلد | اتوار 28 ربیع الاول 1439ھ 17 دسمبر 2017ء 2074ب، صفحات 40، قیمت 20 روپے | شمارہ

ترشاوہ پھلوں کی برآمدی منڈیوں کے لئے درجہ بندی

زراعت نامہ

نوید عصمت کاہلوں

پاکستان میں کنو کی پیداوار دیگر ترشاوہ پھلوں سے تقریباً 80 فیصد زیادہ ہے۔ سٹرس ریسرچ انسٹی ٹیوٹ میں ترشاوہ پھلوں کی برداشت کے انتہائی نازک عوامل تحقیق پر کام ہو رہا ہے۔ ترشاوہ پھلوں کی عالمی منڈیوں تک رسائی حاصل کرنے کے لئے یک پاسی کے قیام کا کردار بہت اہم ہے۔ اگر ترشاوہ پھل کو مخصوص طریقوں سے وکس کے علاوہ دیگر کیمیکلز سے نہ دھویا جائے تو کسان کی ساری محنت رائیگاں جا سکتی ہے۔ ترشاوہ پھل اپنی نفاستی اہمیت کے ساتھ دنیا بھر میں قیمتی غیر ملکی زرمبادلہ کے حصول کا اہم ذریعہ ہیں۔ اس وقت اس اہم فصل پیداوار کا اہم صرف 9 سے 10 فیصد تک برآمد کر کے زرمبادلہ کما رہے ہیں جبکہ اس حجم کو مناسب احتیاط اور سائنسی طریقوں کو اختیار کر کے تین گنا تک بڑھایا جا سکتا ہے۔ ترشاوہ پھلوں کا بیشتر نقصان برداشت اور درجہ بندی جیسے اہم امور کی عدم آگہی کے دوران اکثر باغبان تھیکیداروں کو فروخت کر دیتے جاتے ہیں اور تھیکیدار پھل بہت پہلے توڑ لیتا ہے یا اس کو بہت دیر تک درخت کے اوپر کھڑا رکھتا ہے۔ اندریں حالات پھل کی نفاستی، پختگی اور تجارتی پختگی دونوں متاثر ہوتی ہیں۔ اچھی برداشت کی صورت میں پھل جراثیم سے کم رہتا ہے۔ رگڑ سے میں ہزر اور بیرونی پختگی و جاذبیت سے محروم ہونے کی وجہ سے مارکیٹ میں مناسب قیمت حاصل نہیں کر سکتا اور اس قسم کا پھل برآمدی حجم میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ اسی طرح دیر سے ساتھ ٹوٹے ہوئے پھل میں جوس کی مقدار کم ہو جاتی ہے۔ ڈالنے میں تا خوشگوار تجربہ آتا ہے، پھپھوندی لگ جاتی ہیں اور پھل اپنی خصوصی مٹھاس اور مٹھاس کے مناسب امتزاج سے محروم ہو جاتا ہے۔

یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ برداشت کرتے وقت پھل کو ٹہنی سے توڑا جاتا ہے یا پھر پھل کو ہاتھ سے کھینچ کر یا درانتی یا قینچی سے ڈنڈی اور جوں سمیت توڑ لیا جاتا ہے یا پھلوں کو جھاڑ کر پھل کو زمین پر گرایا جاتا ہے۔ اس عمل سے ایک تو پھل زخمی ہو جاتا ہے اور دوسرا یہ کہ برداشت سے جوں کا بہت زیادہ نقصان ہو جاتا ہے جو عمل ضیائی تالیف میں کمی کی وجہ سے اگلے سال کی فصل پر منفی اثر ڈالتا ہے۔ یہ چیز بھی مشاہدہ میں آئی ہے کہ پھل کو مدار موسم میں بھی توڑ لیا جاتا ہے جس کی وجہ سے پھل اپنی قدرتی مٹھاس، چھلا رنگی ہو جانے کی وجہ سے برقرار نہیں رکھ سکتا اور بعض اوقات چھلا پھٹ جانے کی وجہ سے بازاری ہونے کی وجہ سے اس پر مختلف بیماریوں حملہ کرتی ہیں۔ جو کہ پھل کے گلنے سڑنے کا باعث بنتی ہیں۔ اس سے بچنے کے لئے پھل کو خشک موسم میں۔ قینچی کی مدد سے اور احتیاط کے ساتھ ڈنڈی کے بالکل قریب سے کاٹنا چاہیے تاکہ دوسرے پھل ڈنڈی کی وجہ سے زخمی نہ ہوں۔

اگر برداشت کے وقت مناسب مقامات پر محل نہ کیا جائے تو منزل مقصود تک پہنچتے پہنچتے کم از کم 20 فیصد تک ترشاوہ پھلوں کا نقصان ہو جاتا ہے۔ یہ چیز مشاہدہ میں آئی ہے کہ پھل کو بغیر مناسب پیکنگ کے ٹرالیوں اور ٹرک گاڑیوں کے ذریعے ڈھیر کر کے منڈیوں تک پہنچایا جاتا ہے جس کی وجہ سے پھل گرد و غبار اور دوسرے ناموافق عوامل سے محفوظ نہیں رہ پاتا اور اسکی خاصیت دوران ترسیل بھی متاثر ہوتی ہے اور منزل مقصود تک پھل خراب حالت میں پہنچتا ہے۔ جدید دور میں جبکہ پھلوں کی خاصیت کا بہتر ہونا اور مقررہ بین الاقوامی معیار کے اوپر ان کا پورا اترنا انتہائی ضروری ہو چکا ہے۔ پاکستان میں خصوصاً جناب کنو کی پیداوار کے اضلاع میں نومبر کے آخر میں پھل کی رنگت تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ایسے ان دنوں میں رات کے وقت درجہ حرارت کم ہونے کے دوران ایتھائین گیس کے پیدا ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ پھل کی رنگت علاوہ پھل کی مٹھاس اور تیزابیت کے تناسب سے پختگی کا سائنسی فارمولوں پر پرکھا جا سکتا ہے۔ پھلوں کو پودوں سے توڑنے کے بعد ایک اہم عمل گریڈنگ یا درجہ بندی ہے۔ اس عمل میں پھلوں کو ایک پنسلی پر یا ٹیکریوں میں کنویئر بیلٹ پر پھیلایا جاتا ہے اور سارے پھلوں کو مختلف گریڈوں یا گریڈز میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ مختلف گریڈوں میں پھل کا سائز، بیماری سے پاک ہونا، جلد کا صاف اور مضبوط ہونا اور رنگ وغیرہ کو ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے۔ باغبانوں کو چاہئے کہ اپنی پیداوار کو گریڈنگ کر کے مارکیٹ میں بھیجیں۔ ایک ہی ٹوکری میں ہر قسم کے پھل اکٹھے کر دینے کی وجہ سے اس پھل کی مارکیٹ میں صحیح قیمت نہیں ملتی اور بیرون ملک برآمدات میں مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ☆☆☆